

ROBLE

nothofagus obliqua

Nothofagus obliqua, conocido como Roble, Coyán, Hualle o Pellín, tiene hojas simples alternas, de forma ovada asimétrica y de borde doblemente aserrado. Pierde las hojas en otoño.

Entre enero y marzo se encuentran los frutos, dispuestos de a tres en un depósito de cuatro valvas llamado cúpula, que es similar para todos los *Nothofagus* chilenos, salvo la Lenga, pero con diferencias de tamaño.

Son árboles de gran tamaño que también alcanzan las mayores alturas en los bosques donde viven. La corteza áspera forma placas rectangulares o se desprende dejando hendiduras redondeadas según la región y la edad del árbol.



El Roble es uno de los componentes principales de los bosques de altura, desde Santiago hasta Ñuble, en tanto que desde ahí hasta Llanquihue es el más importante en el Llano Central y en los primeros faldeos de las Cordilleras.



ROBLE

nothofagus obliqua

Nothofagus obliqua, known as *Roble*, *Coyán*, *Hualle* or *Pellín*, has simple alternate leaves, with an oval and asymmetrical shape and with a doubly serrated margin. It loses its leaves in Autumn.

Between January and March the fruits are found disposed into groups of three in a deposit of four valves called cupule, which are similar among all the Chilean *Nothofagus*, except *Lenga*, but with differences in their size.

They are trees of great size which also reach the greatest heights in the forest where they live. The rough bark forms rectangular plates or falls off leaving round fissures according to the region and the age of the tree.



Roble is one of the main components of the high altitude forests from Santiago to Ñuble; from Ñuble to Llanquihue it is the most important tree in the Central valleys and in the first slopes of the mountain ranges.

